CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA

EGZAMIN MATURALNY
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

FORMUŁA OD 2015
(„NOWA MATURA”)
FORMUŁA DO 2014
(„STARA MATURA”)

MATEMATYKA
POZIOM PODSTAWOWY

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ
ARKUSZ MMA-P1

CZERWIEC 2016

Klucz punktowania zadań zamkniętych

Nr zad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Odp.	C	B	D	B	D	A	C	B	C	A	C	A	A	D	B	A	C	C	B	D	B	D	B	A	D

Schematy oceniania zadań otwartych

Zadanie 26. (0–2)

Rozwiąż równanie $\frac{2x+1}{2x}=\frac{2x+1}{x+1}$, gdzie $x\neq -1$ i $x\neq 0$.

Rozwiązanie

Równanie ma sens liczbowy dla każdej liczby rzeczywistej $x\neq -1$ i $x\neq 0$.

I sposób rozwiązania

Przekształcamy równanie w sposób równoważny

$$\frac{2x+1}{2x}-\frac{2x+1}{x+1}=0,$$

$$\frac{(2x+1)(x+1)-2x(2x+1)}{2x(x+1)}=0,$$

$$\frac{2x^2+3x+1-4x^2-2x}{2x(x+1)}=0,$$

$$\frac{-2x^2+x+1}{2x(x+1)}=0.$$

Stąd otrzymujemy równanie kwadratowe

$$-2x^2+x+1=0.$$

Ponieważ $\Delta=1^2-4\cdot(-2)\cdot 1=9$, to równanie ma dwa rozwiązania

$$x_1=-\frac{1}{2},\ x_2=1.$$

Każda z otrzymanych liczb jest różna od -1 i od 0. Zatem każda z tych liczb jest rozwiązaniem naszego równania.

II sposób rozwiązania

Przedstawiamy równanie w postaci równoważnej

$$(2x+1)\left(\frac{1}{2x}-\frac{1}{x+1}\right)=0.$$

Z własności iloczynu, otrzymujemy

$$2x+1=0 \text{ lub } \frac{1}{2x}-\frac{1}{x+1}=0.$$

Rozwiązaniem pierwszego z równań jest liczba $x=-\frac{1}{2}$.

Zapiszmy równanie $\frac{1}{2x}-\frac{1}{x+1}=0$ w postaci równoważnej

$$\frac{(x+1)-2x}{2x(x+1)}=0,$$

$$\frac{-x+1}{2x(x+1)}=0.$$

Stąd $x=1$.
Każda z otrzymanych liczb jest różna od -1 i od 0. Zatem każda z tych liczb jest rozwiązaniem naszego równania.

III sposób rozwiązania
Z własności proporcji możemy równanie zapisać w postaci równoważnej

$$(2x+1)(x+1)-2x(2x+1)=0,$$

$$(2x+1)(x+1-2x)=0,$$

$$(2x+1)(1-x)=0.$$

Stąd

$$2x+1=0 \text{ lub } 1-x=0,$$

$$x=-\frac{1}{2} \text{ lub } x=1.$$

Każda z otrzymanych liczb jest różna od -1 i od 0. Zatem każda z tych liczb jest rozwiązaniem naszego równania.

Schemat punktowania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy zapisze równanie w postaci

- równania kwadratowego w postaci uporządkowanej lub iloczynowej: $-2x^2+x+1=0$, $(2x+1)(1-x)=0$

albo

- alternatywy równań, np.: $2x+1=0$ lub $\frac{1}{2x}-\frac{1}{x+1}=0$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy wyznaczy rozwiązania równania: $x_1=-\frac{1}{2}$, $x_2=1$.

Uwaga:

Jeżeli zdający podzieli obie strony równania $\frac{2x+1}{2x}=\frac{2x+1}{x+1}$ i nie zapisze, że $2x+1\neq 0$, to może otrzymać co najwyżej **1 punkt**.


Zadanie 27. (0–2)

Dane są proste o równaniach $y = x + 2$ oraz $y = -3x + b$, które przecinają się w punkcie leżącym na osi *Oy* układu współrzędnych. Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w danych prostych, a trzeci jest zawarty w osi *Ox*.

Rozwiązanie

Zauważmy, że prosta o równaniu $y = x + 2$ przecina oś *Oy* w punkcie $(0, 2)$. Zatem współczynnik *b* w równaniu $y = -3x + b$ jest równy 2, a więc druga z prostych ma równanie postaci $y = -3x + 2$.

Geometryczną ilustracją opisanej sytuacji jest trójkąt wskazany na wykresie.



Podstawa trójkąta ma długość $2\frac{2}{3}$, a jego wysokość jest równa 2. Zatem pole tego trójkąta jest równe

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot 2 = \frac{8}{3}.$$

Schemat punktowania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.

gdy

- zapisze wartość współczynnika *b* w równaniu prostej $y = -3x + b$: $b = 2$

albo

- prawidłowo narysuje wykresy obu funkcji i zaznaczy punkt $(0, 2)$.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.

gdy obliczy pole trójkąta: $\frac{8}{3}$.

Zadanie 28. (0–2)

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych *x*, *y* prawdziwa jest nierówność

$$x^4 + y^4 + x^2 + y^2 \geq 2\left(x^3 + y^3\right).$$

Rozwiązanie

I sposób rozwiązania

Zapiszmy nierówność $x^4 + y^4 + x^2 + y^2 \geq 2\left(x^3 + y^3\right)$ w postaci równoważnej

$$x^4 - 2x^3 + x^2 + y^4 - 2y^3 + y^2 \geq 0,$$

$$\left(x^2 - x\right)^2 + \left(y^2 - y\right)^2 \geq 0.$$

Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny, więc $\left(x^2-x\right)^2 \geq 0$ i $\left(y^2-y\right)^2 \geq 0$ dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y. Suma dwóch liczb nieujemnych jest nieujemna, więc otrzymana nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y.

II sposób rozwiązania

Zapiszmy nierówność $x^4+y^4+x^2+y^2 \geq 2\left(x^3+y^3\right)$ w postaci równoważnej

$$x^4-2x^3+x^2+y^4-2y^3+y^2 \geq 0,$$
$$x^2\left(x^2-2x+1\right)+y^2\left(y^2-2y+1\right) \geq 0,$$
$$x^2(x-1)^2+y^2(y-1)^2 \geq 0.$$

Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny, więc $x^2 \geq 0$, $(x-1)^2 \geq 0$, $y^2 \geq 0$ i $(y-1)^2 \geq 0$ dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y. Iloczyn liczb nieujemnych jest nieujemny, więc dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwe są nierówności $x^2(x-1)^2 \geq 0$ i $y^2(y-1)^2 \geq 0$. Suma dwóch liczb nieujemnych jest nieujemna, więc otrzymana nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y.

Schemat punktowania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy

- zapisze nierówność w postaci $\left(x^2-x\right)^2+\left(y^2-y\right)^2 \geq 0$ i popełni błędy przy jej uzasadnianiu, np. przez zapisanie, że po lewej stronie są składniki dodatnie

albo


- $x^2(x-1)^2+y^2(y-1)^2 \geq 0$ i popełnia błędy przy jej uzasadnianiu, np. przez zapisanie, że po lewej stronie są składniki dodatnie

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy zapisze wyrażenie w postaci sumy nieujemnych składników i sformułuje wniosek.

Zadanie 29. (0–2)

Dany jest trapez prostokątny $ABCD$ o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Dwusieczna kąta ABC przecina ramię AD w punkcie E oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F (zobacz rysunek).




Wykaż, że w czworokącie $CDEF$ sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.

Rozwiązanie

I sposób rozwiązania

Półproste BF i CF to dwusieczne kątów ABC i BCD przy ramieniu BC trapezu $ABCD$. Oznaczmy zatem miary tych kątów odpowiednio 2α i 2β jak na rysunku.



Suma miar kątów trapezu przy jego ramieniu jest równa 180° ,więc

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ,$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ.$$

Suma miar kątów trójkąta jest równa 180° , więc miara kąta BFC jest równa

$$\left|\sphericalangle BFC\right| = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Stąd wynika, że

$$\left|\sphericalangle CFE\right| = 180^\circ - \left|\sphericalangle BFC\right| = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Kąt CDE jest prosty, gdyż trapez jest prostokątny, więc suma miar przeciwległych kątów CDE i CFE czworokąta $CDEF$ jest równa


$$\left|\sphericalangle CDE\right| + \left|\sphericalangle CFE\right| = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$

Suma miar kątów czworokąta jest równa 360° , więc suma miar dwóch pozostałych kątów czworokąta $CDEF$ jest równa

$$\left|\sphericalangle DCF\right| + \left|\sphericalangle DEF\right| = 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ.$$

Zatem $\left|\sphericalangle CDE\right| + \left|\sphericalangle CFE\right| = \left|\sphericalangle DCF\right| + \left|\sphericalangle DEF\right|$, co kończy dowód.

II sposób rozwiązania
Półproste *BF* i *CF* to dwusieczne kątów *ABC* i *BCD* przy ramieniu *BC* trapezu *ABCD*. Oznaczmy zatem miary tych kątów odpowiednio 2α i 2β jak na rysunku.



Proste *AB* i *CD* są równoległe, więc naprzemianległe kąty *BGC* i *DCG* są równe, czyli

$$|\sphericalangle BGC| = \beta .$$

Zatem trójkąt *BCG* jest równoramienny. Stąd i z równości kątów *CBF* i *GBF* wynika z kolei, że trójkąty *BCF* i *BFG* są przystające. Zatem ich kąty przy wierzchołku *F* są równe. Są to jednak kąty przyległe, więc są to kąty proste. W rezultacie

$$|\sphericalangle CFE| = 180^\circ - |\sphericalangle BFC| = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ .$$


Dalsza część dowodu przebiega tak, jak w I sposobie.

Schemat punktowania I i II sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy wyznaczy miarę kąta *BFC*: 90° i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy przeprowadzi pełny dowód.

III sposób rozwiązania
Półproste *BF* i *CF* to dwusieczne kątów *ABC* i *BCD* przy ramieniu *BC* trapezu *ABCD*. Oznaczmy zatem miary tych kątów odpowiednio 2α i 2β jak na rysunku.



Trójkąt *ABE* jest prostokątny, więc $|\sphericalangle BEA| = 90^\circ - \alpha$. Zatem

$$|\sphericalangle DEF| = 180^\circ - |\sphericalangle BEA| = 180^\circ - (90^\circ - \alpha) = 90^\circ + \alpha .$$

Suma miar przeciwległych kątów *DEF* i *DCF* w czworokącie *CDEF* jest zatem równa

(1) $$|\sphericalangle DEF| + |\sphericalangle DCF| = (90^\circ + \alpha) + \beta = 90^\circ + \alpha + \beta .$$

Kąt *CFE* jest kątem zewnętrznym trójkąta *CBF*, więc

$$|\sphericalangle CFE| = \alpha + \beta .$$

Kąt *EDC* jest prosty, gdyż trapez jest prostokątny, więc suma miar przeciwległych kątów *CDE* i *CFE* czworokąta *CDEF* jest równa

$$|\sphericalangle CDE| + |\sphericalangle CFE| = 90^\circ + \alpha + \beta .$$

Stąd i z (1) otrzymujemy $|\sphericalangle DEF| + |\sphericalangle DCF| = |\sphericalangle CDE| + |\sphericalangle CFE|$. To kończy dowód.


Schemat punktowania III sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy wyznaczy miary kątów przy wierzchołkach *E* i *F* czworokąta *CDEF* w zależności od α i β: $|\sphericalangle AEB| = 90^\circ - \alpha$, $|\sphericalangle CFE| = \alpha + \beta$ i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy przeprowadzi pełny dowód.

Zadanie 30. (0–4)

W trójkącie *ABC* dane są długości boków $|AB| = 15$ i $|AC| = 12$ oraz $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, gdzie $\alpha = \sphericalangle BAC$. Na bokach *AB* i *AC* tego trójkąta obrano punkty odpowiednio *D* i *E* takie, że $|BD| = 2|AD|$ i $|AE| = 2|CE|$ (zobacz rysunek).



Oblicz pole

a) trójkąta *ADE*.

b) czworokąta *BCED*.

Rozwiązanie I sposób

Ponieważ $|BD| = 2|AD|$ i $|AE| = 2|CE|$ oraz $|AB| = 15$ i $|AC| = 12$, więc

$$|AD| = \frac{1}{3}|AB| = \frac{1}{3}\cdot 15 = 5 \text{ oraz } |AE| = \frac{2}{3}|AC| = \frac{2}{3}\cdot 12 = 8 .$$

Z jedynki trygonometrycznej otrzymujemy

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{16}{25}} = \frac{3}{5}.$$

Zatem pole trójkąta *ABC* jest równe

$$P_{ABC} = \frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot|AC|\cdot\sin\alpha = \frac{1}{2}\cdot 15\cdot 12\cdot\frac{3}{5} = 54 ,$$

a pole trójkąta *ADE* jest równe


$$P_{ADE} = \frac{1}{2}\cdot|AD|\cdot|AE|\cdot\sin\alpha = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot\frac{3}{5} = 12 .$$

Zatem pole czworokąta *BCDE* jest równe

$$P_{BCDE} = P_{ABC} - P_{ADE} = 54 - 12 = 42 .$$

Rozwiązanie II sposób

Poprowadźmy wysokość *CF* trójkąta *ABC* oraz wysokość *EG* trójkąta *ADE* jak na rysunku.



Z trójkąta prostokątnego *AFC* otrzymujemy

$$\cos\alpha = \frac{|AF|}{|AC|}, \text{ czyli } \frac{4}{5} = \frac{|AF|}{12}.$$

Stąd $|AF| = \frac{48}{5}$.

Z twierdzenia Pitagorasa natomiast

$$|AC|^2 = |AF|^2 + |CF|^2,$$

$$12^2 = \left(\frac{48}{5}\right)^2 + h^2 .$$

Stąd $h = \sqrt{12^2 - \left(\frac{48}{5}\right)^2} = \frac{36}{5}$.

Pole trójkąta *ABC* jest zatem równe

$$P_{ABC} = \frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot h = \frac{1}{2}\cdot 15\cdot\frac{36}{5} = 54 .$$

Trójkąty *AFC* i *AGE* są podobne, gdyż oba są prostokątne i mają wspólny kąt ostry przy wierzchołu *A*. Zatem

$$\frac{|EG|}{|CF|} = \frac{|AE|}{|AC|}.$$

Ponieważ $|AE| = 2|CE|$, więc $|AE| = \frac{2}{3}|AC|$. Otrzymujemy zatem

$$\frac{p}{\frac{36}{5}} = \frac{\frac{2}{3}|AC|}{|AC|} = \frac{2}{3}.$$


Stąd $p = \frac{2}{3}\cdot\frac{36}{5} = \frac{24}{5}$. Skoro $|BD| = 2|AD|$ i $|AB| = 15$, to $|AD| = \frac{1}{3}|AB| = \frac{1}{3}\cdot 15 = 5$. Pole trójkąta *ADE* jest zatem równe

$$P_{ADE} = \frac{1}{2}\cdot|AD|\cdot p = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot\frac{24}{5} = 12 .$$

Zatem pole czworokąta *BCDE* jest równe

$$P_{BCDE} = P_{ABC} - P_{ADE} = 54 - 12 = 42 .$$

Uwaga:
Pole trójkąta *ADE* możemy tez obliczyć inaczej. Poprowadźmy wysokość tego trójkąta z wierzchołka *D*.



Ponieważ $|BD| = 2|AD|$ i $|AB| = 15$, więc $|AD| = \frac{1}{3}|AB| = \frac{1}{3} \cdot 15 = 5$.

Z trójkąta prostokątnego *ADM* otrzymujemy

$$\cos\alpha = \frac{|AM|}{|AD|}, \text{ czyli } \frac{4}{5} = \frac{|AM|}{5}.$$

Stąd $|AM| = 4$. Zatem z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta

$$q = \sqrt{|AD|^2 - |AM|^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

Skoro $|AE| = 2|EC|$ i $|AC| = 12$, to $|AE| = \frac{2}{3}|AC| = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$. Pole trójkąta *ADE* jest zatem równe

$$P_{ADE} = \frac{1}{2} \cdot |AE| \cdot q = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12.$$

Schemat punktowania I i II sposobu rozwiązania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.
Zdający

- obliczy sinus kąta *BAC*: $\sin\alpha = \frac{3}{5}$

albo

- długość jednego z odcinków *AD*, *AE*: $|AD| = 5$, $|AE| = 8$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.
Zdający obliczy

- pole trójkąta *ABC*: $P_{ABC} = 54$

albo

- obliczy $\sin\alpha$ i długości obu odcinków *AD* i *AE*: $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $|AD| = 5$, $|AE| = 8$,

albo

- wysokość trójkąta *ADE* opuszczoną z wierzchołka *E*: $p = \frac{24}{5}$,

albo

- wysokość trójkąta *ADE* opuszczoną z wierzchołka *D*: $q = 3$.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.
Zdający obliczy pole trójkąta ADE: $P_{ADE}=12$.

Rozwiązanie pełne ..... 4 p.
Zdający obliczy pole czworokąta $BCDE$: $P_{BCDE}=42$.

Uwaga:
Jeżeli zdający rozwiązuje zadanie z wykorzystaniem faktu, że rozważany trójkąt jest prostokątny i nie przedstawia uzasadnienia tego faktu, to może otrzymać maksymalną liczbę punktów za całe rozwiązanie.

Zadanie 31. (0–5)
Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n) określony dla każdej liczby naturalnej $n\geq 1$, w którym $a_1+a_2+a_3+a_4=2016$ oraz $a_5+a_6+a_7+...+a_{12}=2016$. Oblicz pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu (a_n).

Rozwiązanie
Rozwiązanie zadania składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na obliczeniu pierwszego wyrazu i różnicy ciągu (a_n). Drugi etap polega na wyznaczeniu najmniejszego dodatniego wyrazu tego ciągu.

I sposób rozwiązania I etapu
Z warunków zadania wynika, że $a_1+a_2+a_3+a_4=2016$ i $a_5+a_6+...+a_{12}=2016$.
Ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1+(a_1+r)+(a_1+2r)+(a_1+3r)=2016 \text{ i } (a_1+4r)+(a_1+5r)+...+(a_1+11r)=2016,$$
$$4a_1+6r=2016 \text{ i } 8a_1+60r=2016,$$
$$2a_1+3r=1008 \text{ i } 2a_1+15r=504.$$

Odejmując stronami równania, otrzymujemy

$$12r=-504,$$
$$r=-42.$$

Zatem $2a_1+3\cdot(-42)=1008$, więc $a_1=504+3\cdot 21=567$.

II sposób rozwiązania I etapu
Z warunków zadania wynika, że $a_1+a_2+a_3+a_4=2016$ i $a_5+a_6+...+a_{12}=2016$.
Ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1+(a_1+r)+(a_1+2r)+(a_1+3r)=2016,$$
$$4a_1+6r=2016,$$
$$2a_1+3r=1008.$$

Zauważmy, że lewa strona równania $a_5+a_6+...+a_{12}=2016$ jest sumą ośmiu wyrazów ciągu arytmetycznego $(a_5,a_6,a_7,...,a_{12})$ o różnicy r. Ze wzoru na sumą n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, otrzymujemy

$$\frac{a_5+a_{12}}{2}\cdot 8=2016,$$
$$a_5+a_{12}=504.$$

Stąd i ze wzoru na *n*-ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1+4r+a_1+11r=504,$$

$$2a_1+15r=504.$$

Po rozwiązaniu otrzymanego układu równań otrzymujemy $a_1=567$ i $r=-42$.

III sposób rozwiązania I etapu

Z warunków zadania wynika, że $a_1+a_2+a_3+a_4=2016$ i $a_5+a_6+...+a_{12}=2016$.

Zauważmy, że sumując te równania stronami, otrzymujemy $a_1+a_2+...+a_{12}=4032$.

Otrzymaliśmy w ten sposób układ równań

$$S_4=2016 \text{ i } S_{12}=4032,$$

który, korzystając ze wzoru na sumę *n*-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, możemy zapisać w postaci

$$\frac{a_1+a_4}{2}\cdot 4=2016 \text{ i } \frac{a_1+a_{12}}{2}\cdot 12=4032,$$

$$a_1+a_4=1008 \text{ i } a_1+a_{12}=672.$$

Ze wzoru na *n*-ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1+(a_1+3r)=1008 \text{ i } a_1+(a_1+11r)=672,$$

$$2a_1+3r=1008 \text{ i } 2a_1+11r=672.$$

Po rozwiązaniu otrzymanego układu równań otrzymujemy $a_1=567$ i $r=-42$.

IV sposób rozwiązania I etapu

Z warunków zadania wynika, że $a_1+a_2+a_3+a_4=2016$ i $a_5+a_6+...+a_{12}=2016$.

Zauważmy, że

$$a_5+a_6+...+a_{12}=(a_1+a_2+...+a_{12})-(a_1+a_2+a_3+a_4),$$

czyli

$$a_5+a_6+...+a_{12}=S_{12}-S_4.$$

Otrzymaliśmy w ten sposób układ równań

$$S_4=2016 \text{ i } S_{12}-S_4=2016,$$

który, korzystając ze wzoru na sumę *n*-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, możemy zapisać w postaci

$$\frac{a_1+a_4}{2}\cdot 4=2016 \text{ i } \frac{a_1+a_{12}}{2}\cdot 12-\frac{a_1+a_4}{2}\cdot 4=2016,$$

$$a_1+a_4=1008 \text{ i } 6a_1+6a_{12}-2a_1-2a_4=2016.$$

$$a_1+a_4=1008 \text{ i } 4a_1-2a_4+6a_{12}=2016.$$

Ze wzoru na *n*-ty wyraz ciągu arytmetycznego otrzymujemy

$$a_1+(a_1+3r)=1008 \text{ i } 4a_1-2(a_1+3r)+6(a_1+11r)=2016,$$

$$2a_1+3r=1008 \text{ i } 8a_1+60r=2016,$$

$$2a_1+3r=1008 \text{ i } 2a_1+15r=504.$$

Po rozwiązaniu otrzymanego układu równań otrzymujemy $a_1=567$ i $r=-42$.

Rozwiązanie II etapu

Ciąg (a_n) jest więc opisany wzorem ogólnym $a_n=567+(n-1)\cdot(-42)=609-42n$ dla $n\geq 1$.

Wyznaczmy numery wszystkich dodatnich wyrazów ciągu.

$$a_n > 0,$$
$$609 - 42n > 0,$$
$$n < \frac{609}{42} = 14\frac{1}{2}.$$

Ponieważ $r = -42 < 0$, więc ciąg (a_n) jest malejący. Wynika stąd, że najmniejszym dodatnim wyrazem ciągu jest $a_{14} = 609 - 42 \cdot 14 = 21$.

Uwaga:

Najmniejszy dodatni wyraz ciągu (a_n) możemy też wyznaczyć w inny sposób. Ponieważ $r = -42 < 0$, więc ciąg (a_n) jest malejący. Zauważmy, że jednym z wyrazów ciągu (a_n) jest $567 - 14 \cdot 42 = 21$, a następnym $21 - 42 = -21 < 0$. Stąd wynika, że najmniejszy dodatni wyraz ciągu to 21.

Schemat punktowania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.

Zdający zastosuje

- wzór na sumę *n*-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i zapisze jedno z równań wynikających z treści zadania:
  $\frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016$, $4a_1 + 6r = 2016$, $\frac{a_5 + a_{12}}{2} \cdot 8 = 2016$, $8a_1 + 60r = 2016$,
  $\frac{a_1 + a_{12}}{2} \cdot 12 = 4032$

albo

- wzór na *n*-ty wyraz ciągu arytmetycznego i wyznaczy jeden z wyrazów a_n dla $n > 1$ w zależności od a_1 i r, np. $a_2 = a_1 + r$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Uwaga

Jeżeli zdający zapisze, że $S_{12} = 4032$, to otrzymuje **1 punkt**.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.

Zdający zapisze dwa równania wynikające z podanych sum wyrazów ciągu i wyznaczy jeden z wyrazów a_n dla $n > 1$ w zależności od a_1 i r, np.:

$$\frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4 = 2016 \text{ i } \frac{a_5 + a_{12}}{2} \cdot 8 = 2016 \text{ i } a_4 = a_1 + 3r.$$

Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.

Zdający zapisze układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi pozwalający obliczyć pierwszy wyraz i różnicę ciągu (a_n), np.:

$$\frac{a_1 + a_1 + 3r}{2} \cdot 4 = 2016 \text{ i } \frac{a_1 + 4r + a_1 + 11r}{2} \cdot 8 = 2016.$$

Rozwiązanie prawie pełne ..... 4 p.

Zdający

- obliczy pierwszy wyraz i różnicę ciągu (a_n): $a_1 = 567$, $r = -42$

albo


- obliczy pierwszy wyraz, różnicę i najmniejszy dodatni wyraz ciągu (a_n), popełniając po drodze błędy rachunkowe.

Rozwiązanie pełne ..... 5 p.
Zdający obliczy pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz ciągu (a_n):
$a_1 = 567$, $r = -42$, $a_{14} = 21$.

Uwagi:
1. Jeżeli zdający błędnie zinterpretuje treść zadania przyjmując, że $a_5 + a_6 + ... + a_{12}$ jest sumą 12 początkowych wyrazów ciągu, to może otrzymać co najwyżej **1 punkt**.
2. Jeżeli zdający zauważy, że $a_5 + a_6 + ... + a_{12}$ jest sumą 8 wyrazów ciągu, ale zapisze błędnie, że jest ona równa $\frac{2a_1+(8-1)r}{2} \cdot 8$, to może otrzymać za całe rozwiązanie co najwyżej **3 punkty**.
3. Jeżeli zdający zapisze, że $a_5 + a_6 + ... + a_{12}$ jest sumą 7 wyrazów ciągu i konsekwentnie zapisze tę sumę w postaci $\frac{2a_5+(7-1)r}{2} \cdot 7$, to może otrzymać za całe rozwiązanie co najwyżej **3 punkty**.

Zadanie 32. (0–4)
Dany jest stożek o objętości 8π, w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest równy $3:8$. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.

Rozwiązanie
Niech *r*, *h* i *l* oznaczają odpowiednio promień podstawy, wysokość i tworzącą danego stożka.



Objętość stożka jest równa

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h .$$

Stąd

$$8\pi = \frac{1}{3}\pi r^2 h ,$$
$$r^2 h = 24 .$$

Z treści zadania wynika, że $\frac{h}{r} = \frac{3}{8}$, skąd $h = \frac{3}{8}r$.

Otrzymujemy równanie

$$r^2 \cdot \frac{3}{8}r = 24 ,$$
$$r^3 = 64 ,$$
$$r = 4 .$$

Zatem $h = \frac{3}{8} \cdot 4 = \frac{3}{2}$.

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta *BSO* otrzymujemy

$$r^2+h^2=l^2,$$

$$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{4^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{73}{4}}=\frac{\sqrt{73}}{2}.$$

Pole powierzchni całkowitej stożka jest równe

$$P_b=\pi rl=\pi\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{73}}{2}=2\sqrt{73}\,\pi.$$

Schemat punktowania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.

Zdający zapisze zależność między wysokością i promieniem podstawy stożka

- wynikającą z podanego stosunku, np.: $\frac{h}{r}=\frac{3}{8}$

albo

- wynikającą z podanej objętości: $r^2h=24$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.

Zdający zapisze równanie z jedną niewiadomą, np.: $r^2\cdot\frac{3}{8}r=24$.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.

Zdający obliczy promień podstawy lub wysokość stożka: $r=4$, $h=\frac{3}{2}$.

Rozwiązanie pełne ..... 4 p.

Zdający obliczy pole powierzchni bocznej danego stożka: $P_b=2\sqrt{73}\,\pi$.

Zadanie 33. (0–4)

Rejsowy samolot z Warszawy do Rzymu przelatuje nad Austrią każdorazowo tą samą trasą z taką samą zakładaną prędkością przelotową. We wtorek jego średnia prędkość była o 10% większa niż prędkość przelotowa, a w czwartek średnia prędkość była o 10% mniejsza od zakładanej prędkości przelotowej. Czas przelotu nad Austrią w czwartek różnił się od wtorkowego o 12 minut. Jak długo trwał przelot tego samolotu nad Austrią we wtorek?

Rozwiązanie

Oznaczmy przez v prędkość, z jaką zwykle leci samolot na tej trasie, przez s oznaczmy długość trasy, gdy samolot znajduje się nad terytorium Austrii, a przez t oznaczmy czas przelotu we wtorek. Zatem prędkość, z jaką samolot leciał we wtorek była równa $1{,}1v$, a prędkość, z jaką samolot leciał w czwartek była równa $0{,}9v$. Czas przelotu w czwartek był równy $t+12$ minut. Zatem

$$1{,}1v\cdot t=s \text{ oraz } 0{,}9v\cdot(t+12)=s.$$

Stąd

$$1{,}1v\cdot t=0{,}9v\cdot(t+12),$$

$$11t=9(t+12),$$

$$2t=9\cdot 12,$$

$$t=9\cdot 6=54.$$

Odpowiedź: Czas, w jakim samolot przelatywał we wtorek nad Austrią był równy 54 minuty.

Schemat punktowania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.
Zdający zapisze jedno z równań opisujących zależność prędkości i czasu przelotu nad Austrią, np.: $1,1v \cdot t = s$ lub $0,9v \cdot (t+12) = s$.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.
Zdający zapisze oba równania pozwalające obliczyć czas przelotu nad Austrią we wtorek lub w czwartek, np.: $1,1v \cdot t = 0,9v \cdot (t+12)$.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.
Zdający zapisze równanie z jedną niewiadomą t, np.: $11t = 9(t+12)$.

Rozwiązanie pełne ..... 4 p.
Zdający wyznaczy czas przelotu: 54 minuty (lub 0,9 godziny).

Uwaga:
Jeżeli zdający stosuje błędny model, np. przyjmuje, że wzrostowi prędkości o 10% odpowiada skrócenie czasu o 10% albo przyjmuje, że wzrostowi prędkości odpowiada wydłużenie czasu, to za całe rozwiązanie otrzymuje **0 punktów**.